

 어린이 생물도감

: 2026 5 27 9:34



2012년도 식물-공중
표본정보DB 구축사업

PLANTS OF KOREA <애기괭이밥 >
Family : 팽이버섯과
Species : *Oxalis acetosella*
Locality : 대구광역시 동구 금강동
Hab. & Note : 해변이 갈짜이는 여백관동.
잎사귀가 매운맛이고, 꽃은 파란색. 병리가 흔하다.
Collector & No. : 정병진 2012
Collector Date : 2010. 5. 8
Yeungnam University Herbarium (YNUH)

애기괭이밥 / *Oxalis acetosella* L.

구분	설명
생물분류	식물
속국명	괭이밥속
과국명	괭이밥과
과명	Oxalidaceae
일반특징	<p>요약설명 : 괭이밥과의 여러해살이풀로 북반구의 온대 북부에 분포하며 제주, 전남, 경남, 강원, 경기, 평북, 함남, 함북에 야생한다.</p> <p>분포지역 : 북반구의 온대 북부에 분포한다. 제주, 전남, 경남, 강원, 경기, 평북, 함남, 함북에 야생한다.</p> <p>형태 : 여러해살이풀</p> <p>크기 : 높이가 5-15cm 정도로 자란다.</p> <p>꽃색 : 백색</p> <p>개화기 : 6월, 5월</p> <p>잎은 뿌리 부근에서 나온다. 잎자루는 관절이 있다. 잎자루 끝에서 3개의 작은잎이 옆으로 퍼진다. 턱잎은 달걀모양이며 잎자루 밑부분에 붙어 있다. 꽃은 흰색으로 5~6월에 핀다. 뿌리에서 작은 이삭의 꽃대가 나와 줄기 끝에 1송이 달린다. 꽃부리는 넓은 종 모양이다. 꽃받침은 5개이며 좁은 달걀모양이다. 꽃잎은 5개이며 흰색 바탕에 연한 자줏빛이 돈다. 10개의 수술이 있고 1개의 암술이 있다.</p> <p>열매는 삭과로 달걀모양 원형이고 털이 없다.</p> <p>전체에 털이 흩어져 있고 땅속 줄기에는 비늘조각이 있다.</p> <p>가늘고 긴 뿌리줄기가 옆으로 뻗는다. 지상에는 쓰러져 남은 묵은 잎자루 비늘처럼 붙어 있고 그 위에서 3~5개의 잎이 나온다.</p> <p>깊은 산 계곡의 숲속에서 자라며 씨로 번식한다.</p>