



: 2026 1 19 4:09



FLORA OF KOREA
Herbarium of Chonnam National University

개키버들
Gyeonggi-do, Asan-eup, Seon-ri, Yaksasat (temple) -- south slope
of Seon-san (Mt.), 400m -- 547.7m alt.
국가생물자원보호를 위해 살펴보았습니다.
Under deciduous forest (Quercus/Carpinus).
2007. 10. 10.
Im, H. T.
No. 074547

개키버들 / *Salix integra* Thunb.

구분	설명
생물분류	식물
속국명	버드나무속
과국명	버드나무과
과명	Salicaceae
일반특징	<p>요약설명 : 버드나무과 낙엽활엽관목으로 일본과 함경북도를 비롯 온대 북부지역에 많이 자란다.</p> <p>분포지역 : ►일본에도 분포한다. ►함경북도를 비롯 온대 북부지역에 많이 자란다.</p> <p>형태 : 낙엽활엽관목.</p> <p>크기 : 높이 1~3m이다.</p> <p>꽃색 : 자주색</p> <p>개화기 : 4월, 3월, 5월</p> <p>하천유역에서 자란다.</p> <p>일년생가지는 연두색으로서 털이 없고 겨울눈도 달걀 모양 타원형이며 털이 없다. 가지는 길게 뻗으며 노란갈색 또는 갈색이다.</p> <p>잎은 마주나기하지만 가지 밑부분의 잎은 어긋나기한다. 잎모양은 긴 타원형으로 둔두 또는 첨두, 원저이다. 잎 표면은 녹색, 뒷면은 회록색이다.</p> <p>잎이 줄기를 싸고 있는 것 같이 보이고 가장자리에 잔톱니가 있거나 빛밋하며 털이 없다.</p> <p>꽃은 3~5월에 잎보다 먼저 피는데 전년가지의 줄기와 잎자루 사이에 자주색의 꽃이 핀다.</p> <p>열매는 삭과로 4~5월에 익으며 익으면 껍질이 말라 쪼개지면서 씨앗을 퍼뜨린다. 씨앗은 털이 있다.</p>