

## \_어린이 생물도감

: 2026 1 19 4:39



애기똥풀 / *Chelidonium majus* var. *asiaticum* (H. Hara) Ohwi

구분	설명
생물분류	식물
속국명	애기똥풀속

과국명	양귀비과
과명	Papaveraceae
일반특징	<p>요약설명 : 양귀비과의 두해살이풀로 동부아시아의 온대에 분포하고 우리나라 전국 각지에 야생한다.</p> <p>분포지역 : ►동부아시아의 온대에 분포한다.►전국 각지에 야생한다.</p> <p>형태 : 두해살이풀</p> <p>크기 : 높이는 30-80cm 가량된다.</p> <p>꽃색 : 노란색</p> <p>개화기 : 5월, 6월, 8월, 7월</p> <p>잎은 잎자루가 있고 끝이 둥글다. 뒷면은 흰색이며 털이 약간 남아 있기도 하다. 표면은 녹색이며 가장자리에 둔한 톱니와 결각이 있다. 쪽잎은 달걀을 거꾸로 세운 모양의 긴타원형이다.</p> <p>꽃은 5~8월에 원줄기와 가지 끝에서 우상모양꽃차례가 발달하고 황색 꽃이 달린다. 꽃받침조각은 2개이고 타원형이며 일찍 떨어지고 곁에 잔털이 있다.</p> <p>꽃잎은 4개이고 길쭉한 달걀 모양이다. 많은 수술이 있고 암술은 1개이다.</p> <p>암술머리는 약간 굽고 끝이 2개로 얇게 갈라진다.</p> <p>열매는 삭과로 좁은 원기둥 모양이다. 양끝이 좁고 같은 길이의 대가 있다.</p> <p>원뿌리는 땅속 깊이 들어가고 등황색이다.</p> <p>마을 근처의 별이 드는 곳 또는 숲가장자리에서 흔히 자란다. 별이 잘 드는 곳 또는 반그늘에서 재배하고 가급적으로 물 빠짐이 잘 되도록 한다.</p> <p>상처를 내면 등황색의 유액이 나오기 때문에 애기똥풀이라고 한다. 전체가 분백색을 띠며 흰 깃털이 있는 것이 특징이다.</p>