



양귀비 / *Papaver somniferum* L.

구분	설명
생물분류	식물
속국명	양귀비속
과국명	양귀비과

과명	Papaveraceae
일반특징	<p>요약설명 : 양귀비과의 두해살이풀로 이란, 터키, 인도, 중국, 내몽고 등지에 분포하며 우리나라 전국 각지에서 재배한다.</p> <p>분포지역 : ▶이란, 터키, 인도, 중국, 내몽고 등지에 분포한다.▶전국 각지에서 재배한다.</p> <p>형태 : 두해살이풀.</p> <p>크기 : 높이 50~150cm에 달한다.</p> <p>꽃색 : 자주색, 붉은색, 백색</p> <p>개화기 : 5월, 6월</p> <p>잎은 긴 달걀모양이다. 밑부분이 원줄기를 반 정도 얼싸안는다. 끝이 뾰족하며 가장자리에 불규칙한 결각상의 톱니가 있다. 전체가 흰색 가루로 덮여있다.</p> <p>꽃은 5~6월에 피며 흰색 외에 홍색, 자색 등 여러 가지 색이 있다. 원줄기 끝에 1개씩 위를 향해 달리며 꽃봉우리가 밑으로 처진다. 꽃받침조각은 2개이고 타원상 배 모양이다. 꽃잎은 4개이며 둥글다. 그것은 마주나기하며 밑부분의 것이 가장 크다. 많은 수술과 1개의 암술이 있고 암술머리가 사방으로 퍼지는 모양이다.</p> <p>열매는 삭과로 난상 구형이다. 털이 없다. 성숙하면 위쪽 작은 구멍에서 씨가 방출된다.</p> <p>줄기의 높이는 50~150cm이고 전체에 털이 없다.</p> <p>열대에서 온대에 걸쳐 자라는 식물이므로 우리 나라에서는 각지에 재배할 수 있다. 그러나 따뜻한 지방이 재배상 더 유리하다. 씨로 번식한다.</p> <p>설익은 열매 껍질에 상처를 내어, 흘러나오는 액체가 말라 약간 굳어졌을 때 70℃ 이하에서 말린 것을 아편이라고 한다.</p>