



: 2026 1 19 8:47



양버들 / *Populus nigra* var. *italica* Koehne

구분	설명
생물분류	식물
속국명	사시나무속
과국명	버드나무과
과명	Salicaceae
일반특징	<p>요약설명 : 버드나무과의 낙엽 활엽 교목으로 유럽과 우리나라 전국에 식재한다.</p> <p>분포지역 : 유럽; 전국 식재.</p> <p>형태 : 낙엽 활엽 교목, 가지가 수간을 따라 수직으로 자라므로 수형이 피침형.</p> <p>크기 : 높이 30m.</p> <p>꽃색 : 노란색</p> <p>개화기 : 3월, 4월</p> <p>잎은 마름모 비슷한 달걀형이다. 너비가 길이보다 길며 금첨두이다. 뒷면은 황록색이고 가장자리에 둔한톱니가 있다. 잎자루는 편평하다.</p> <p>꽃은 암수딴그루이며 꼬리모양꽃차례에 달리고 3~4월에 핀다.</p> <p>열매는 5~6월에 성숙한다.</p> <p>추위에 강해서 전국 어디서나 잘 자라며 특히 하천유역 및 논, 밭둑에서 많이 볼 수 있다. 햇빛에 대한 요구량이 크고 습기, 바닷바람, 대기오염에 견디는 힘이 강하다.</p> <p>번식은 씨를 이용하거나 1년생 가지를 잘라 봄에 흙 속에 끓어 뿌리내리게 한다.</p> <p>우리나라에 있는 양버들은 대부분 숫나무이다. 오늘날에는 양버들보다 생장이 더 빠른 이태리포플러가 도입되어 재배되고 있으므로 더 이상 심지 않고 있는 실정이다.</p>