



왕머루 / *Vitis amurensis* Rupr.

구분	설명
생물분류	식물
속국명	포도속

과국명	포도과
과명	Vitaceae
일반특징	<p>요약설명 : 포도과의 낙엽활엽 만경목으로 일본, 중국, 만주, 한국에 분포한다.</p> <p>분포지역 : 전국 산야의 표고 100~1,650m 사이의 계곡과 산록에서 자생한다.▶일본, 중국, 만주에 분포한다.</p> <p>형태 : 낙엽활엽 만경목.</p> <p>크기 : 길이가 10m에 달한다.</p> <p>꽃색 : 녹색</p> <p>개화기 : 6월</p> <p>잎은 넓은 달걀모양이고 예두 심장저이다. 끝이 3~5개로 얇게 갈라진다. 표면에는 털이 없으며 뒷면은 털이 없거나 맥 위에 털이 있다. 쪽잎 가장자리에는 작은 치아모양톱니가 있다. 잎은 붉게 단풍이 든다.</p> <p>원뿔모양꽃차례는 잎과 마주 달린다. 꽃대 밑부분에서 흔히 덩굴손이 발달한다. 꽃은 6월에 황록색의 꽃이 핀다. 꽃받침은 바퀴모양이다. 꽃잎은 5개가 끝부분에서 합쳐지고 밑부분이 갈라져 꽃턱에서 떨어진다.</p> <p>열매는 장과로 송이로 되어 아래로 처진다. 9월에 흑색으로 익고 2~3개의 씨가 들어 있다.</p> <p>줄기는 길이가 10m에 달한다. 일년생가지는 뚜렷하지 않은 능선이 있으며 붉은빛이 돈다. 어릴 때는 솜털로 덮여 있으며, 나무껍질은 암갈색이 된다. 별이 드는 곳과 그늘 진 곳 모두에서 잘 자란다. 건조지보다는 습기가 있고 물빠짐이 잘 되는 곳에서 잘 자란다. 추위에 강하여 전국 어느 곳에서든지 자란다.</p> <p>줄기를 꺾어 흙 속에 꽃아 뿌리 내리게 하는 방법으로 번식시키는데, 1년생 줄기를 채취하여 초봄에 실행한다.</p> <p>다래와 더불어 야생열매의 대표적인 덩굴식물이다. 바위 위나 다른 나무 위로 기어올라 울창한 정글을 만든다.</p>