



: 2026 1 16 7:06



왕비늘사초 / *Carex maximowiczii* Miq.

구분	설명
생물분류	식물
속국명	사초속
과국명	사초과

과명	Cyperaceae
일반특징	<p>요약설명 : 사초과 여러해살이풀로 전국에서 자란다.</p> <p>분포지역 : 전국에 분포한다.</p> <p>형태 : 여러해살이풀이다.</p> <p>크기 : 높이 40~70cm이다.</p> <p>꽃색 : 붉은색, 녹색</p> <p>개화기 : 6월, 5월</p> <p>잎은 뒷면에 하얀빛이 돈다. 밑부분의 잎집은 잎이 없으며 검붉은 빛을 띤 누런색이고 잘게 갈라진다.</p> <p>꽃은 5~6월에 피고 작은 이삭은 2~4개로서 대가 있으며 밑으로 처진다.</p> <p>암술이 없는 작은 이삭은 윗부분에 달리고 선 모양이며 수꽃만 달린다.</p> <p>옆부분의 1~3개는 수술이 없는 작은 이삭이고, 원기둥 모양이다. 첫째 포(꽃을 감싸는 작은 잎)는 꽃대보다 길다. 암꽃의 밑부분에 있는 두 개의 작은 잎은 달걀 모양이고 적록색이다. 또한 끝이 둥툭하며 뒷면의 굵은 맥에 3개의 맥이 있다. 암술대는 밑부분이 약간 굽으며 암술머리는 2개이다.</p> <p>열매를 싸고 있는 주머니는 포영보다 약간 길고 양쪽이 볼록하며 작은 돌기가 촘촘하게 모여 있다. 윗부분이 갑자기 좁아져서 짧은 부리가 되며 끝부분이 깃깃하다. 수과는 헐겁게 들어 있으며 넓은 달걀 모양 또는 렌즈 모양이다.</p> <p>줄기는 세모나다.</p> <p>뿌리줄기는 짧게 뻗는다.</p> <p>논둑, 냅가나 습기가 많은 곳에서 자란다.</p>