

 어린이 생물도감

: 2026 4 4 6:50



K H U S	
Serial No.	: k22170001
Family	: Violaceae
Name	Sci. : <i>Viola sachalinensis</i> Boiss.
Loc.	: 왜줄방제비꽃(Wae-jul-bang-je-bi-kkot)
Site	: Mt. Tsaebaeksan, Gangwon-do.
Coll. Date	: 21. Aug. 2004.
Collector	: S. P. Hong, E. H. Jung and J. H. Song.
No. of duplicates	: _____

Kyung Hee University Herbarium

왜줄방제비꽃 / *Viola sachalinensis* H.Boissieu

구분	설명
생물분류	식물
속국명	제비꽃속
과국명	제비꽃과
과명	Violaceae
일반특징	<p>요약설명 : 제비꽃과 여러해살이풀로 우리나라의 함경남도 부전 고원 및 갑산에서 자란다. 중국, 러시아 극동부, 일본 등지에 분포한다.</p> <p>분포지역 : 한국, 중국, 러시아극동부, 일본 등지에 분포한다. 함경남도 부전 고원 및 갑산에서 자란다.</p> <p>형태 : 여러해살이풀</p> <p>크기 : 개화기의 키는 2-5cm, 결실기의 키는 10-25cm 정도이다.</p> <p>꽃색 : 자주색, 보라색</p> <p>개화기 : 5월, 6월</p> <p>뿌리에서 난 잎은 둥근 심장 모양 또는 신장 모양이다. 가장자리에 뭉뚝한 톱니가 있으며 잎자루가 잎몸보다 2~3배 길다. 줄기잎은 잎자루가 짧으며 턱잎이 가장자리에서부터 중간까지 갈라져 있다.</p> <p>꽃은 5월에 자주색으로 피고 잎 달린 자리에 난다. 꽃받침조각은 좁은 창 모양이며 끝이 날카롭고 가장자리가 밋밋하다. 뒤쪽으로 가늘게 튀어나온 꽃뿔은 긴 타원 모양이다.</p> <p>열매는 삭과이고 달걀 같은 타원 모양이며, 짧은 꽃자루에 달린 단힌꽃에서 맺힌다. 이 때, 단힌꽃은 다른 꽃과 꽃가루의 주고받음 없이 열매를 맺는 꽃을 말한다.</p> <p>줄기는 뿌리와 줄기의 경계 부분에 몇 개씩 비스듬히 선다. 마르면 갈색점이 생긴다.</p> <p>뿌리줄기는 짧다.</p> <p>침엽림 또는 사스래피림과 높은 산 지역에서 자란다.</p>