



: 2026 1 18 2:19



1945-08-01 1945-08-01 1945-08-01

유럽점나도나물 / *Cerastium glomeratum* Thuill.

구분	설명
생물분류	식물
속국명	점나도나물속
과국명	석죽과
과명	Caryophyllaceae
일반특징	<p>요약설명 : 석죽과 2년생 초본으로 우리나라의 제주도와 전라북도 고창에서 채집되었다. 북아메리카, 열대아메리카, 일본, 인도 등지에 귀화되었다.</p> <p>분포지역 : ►북아메리카, 열대아메리카, 일본, 인도 등지에 귀화되었다.►제주도와 전라북도 고창에서 채집되었다.</p> <p>형태 : 2년생 초본이다.</p> <p>크기 : 높이 10~30cm이다.</p> <p>꽃색 : 백색</p> <p>개화기 : 6월, 5월, 7월</p> <p>뿌리에서 난 잎과 줄기 아래부분의 잎은 주걱 모양이다. 위쪽의 잎은 타원 모양이고 잎자루는 없다. 초록색이고 양면에 털이 촘촘하게 나 있다.</p> <p>꽃은 4~6월에 피고, 취산꽃차례는 꽃이 필 때는 둥글게 뭉쳐진다. 열매가 맺힐 때는 드문드문 배열된다. 꽃자루의 길이는 꽃받침과 같거나 짧다.</p> <p>꽃받침은 5개로 나뉘고 연한 초록색이다. 긴 털과 분비샘이 발달한 털이 나 있다. 꽃잎은 하얀색이고 5장이다. 끝이 깊게 두 개로 갈라지며 밑부분 가장자리에 털이 있다. 수술은 10개, 암술은 1개이고, 암술머리는 5개로 나뉜다.</p> <p>열매는 원통 모양이고 끝이 열린다. 씨는 연한 갈색이고 사마귀 모양의 작은 돌기로 덮여 있다. 전체적으로 긴 털이 많이 덮여 있다.</p> <p>줄기는 연한 초록색이고 밑부분에서 많이 갈라진다. 줄기 윗부분에는 털과 함께 분비샘이 발달한 털이 섞여 있다. 줄기 끝에서 가지가 갈라진다.</p>