



: 2026 1 16 11:49

---



인가목조팝나무 / *Spiraea chamaedryfolia* L.

---

| 구분   | 설명   |
|------|--|
| 생물분류 | 식물   |
| 속국명  | 조팝나무속  |
| 과국명  | 장미과  |
| 과명   | Rosaceae   |
| 일반특징 | <p>요약설명 : 장미과 낙엽 활엽 관목으로 우리나라의 강원도 및 경상북도, 울릉도, 북부 백두대간에서 자란다. 이 외에 중국, 극동러시아, 일본에도 분포한다.</p> <p>분포지역 : 중국, 극동러시아, 일본; 함경남북도 ~ 강원도 및 경상북도, 울릉도, 북부 백두대간 분포.</p> <p>형태 : 낙엽 활엽 관목.</p> <p>크기 : 높이 1m.</p> <p>꽃색 : 백색</p> <p>개화기 : 6월, 5월</p> <p>잎은 어긋나고 달걀 모양이다. 또한, 끝이 짧고 뾰족하며 원저이다. 곁면에 털이 없고 뒷면은 회백색이며 잎줄 겨드랑이에 털이 있다. 가장자리에는 겹톱니가 있다.</p> <p>꽃은 4월 말~5월 중순에 하얀색으로 피고 새가지 끝의 편평꽃차례 또는 우산모양꽃차례에 달린다. 수술과 암술을 모두 갖고 있는 양성꽃이다.</p> <p>열매는 털이 많고 7~9월에 익는다. 씨앗은 양 끝이 뾰족한 원기둥 모양이다. 가지에는 뚜렷하게 모가 진 선이 있으며 털이 없다.</p> <p>깊은 산의 숲 속에서 잘 자란다. 건조에 강하기 때문에 척박한 곳에서도 적응하며, 무리지어 자란다. 추위와 대기오염에도 강하며 양지와 음지에서도 생장이 양호하다. 씨앗을 뿌리거나 꺾꽂이 또는 포기 나누기를 하여 번식시킨다. 줄기가 훼손되었을 때 새로운 줄기를 만들어내는 능력이 약하다.</p> |