



앞갈애기잎말이나방 / *Spilonota eremitana* Moriuti, 1972

구분	설명
생물분류	곤충
속국명	사과흰애기잎말이나방속
과국명	잎말이나방과

과명	Tortricidae
일반특징	<p>머리, 가슴, 더듬이는 갈색이다. 아랫입술수염은 진한 갈색의 비늘털로 덮여 있다. 그 중 제 2마디는 위로 향해 있으며 넓은 삼각형을 이루고 있다.</p> <p>앞날개는 진한 흑갈색이고 하얀 비늘 조각이 희미하게 나타나 있다. 이것이 흑갈색 물결 모양 무늬처럼 보이기도 한다. 날개가 시작되는 부분의 무늬와 날개 뒤쪽 끝의 검은 무늬 사이에 있는 넓은 부분은 흑갈색으로 채워져 있다. 뒷날개는 갈색이다.</p> <p>수컷의 옆돌기는 곧고 짧으며 끝의 1/3 지점에서 안쪽으로 구부러져 있다. 파악판은 좁고 뒷 가장자리가 완만하게 구부러져 있으며 쿠쿨루스의 끝에 침이 있다.</p> <p>한국, 일본, 중국에 분포한다. 1년에 두 번 볼 수 있다. 애벌레는 일본잎갈나무의 새싹을 묶어 갹아 먹는다. 애벌레의 모습으로 겨울을 난다.</p>