



자주방가지뚥 / *Lactuca sibirica* (L.) Benth. ex Maxim.

구분	설명
생물분류	식물
속국명	왕고들빼기속
과국명	국화과

과명	Compositae
일반특징	<p>요약설명 : 국화과 여러해살이풀로 우리나라의 부전고원에서 백두산지역을 거쳐 북부 지방에까지 분포되어 있다.</p> <p>분포지역 : 부전고원에서 백두산지역을 거쳐 북부지방에까지 분포되어 있다.</p> <p>형태 : 여러해살이풀</p> <p>크기 : 높이가 60-90cm이다.</p> <p>꽃색 : 파란색</p> <p>개화기 : 8월, 7월</p> <p>뿌리에서 난 잎과 밑부분의 잎은 꽃이 필 때 떨어진다. 가운데 달린 잎은 긴 타원 같은 창 모양 또는 긴 타원 모양이다. 끝이 길게 뿔뚝해지고 양면에 털이 없다. 또한 가장자리는 갈라지거나 톱니가 있으며, 밑부분이 줄기를 감싼다.</p> <p>꽃은 7~8월에 하늘색으로 피고 머리모양꽃차례는 엉성하게 꽃대 끝이 평평한 모양으로 달린다. 총포는 통 모양이고 밑에 총포조각이 있다.</p> <p>총포조각은 3줄로 배열되며 자줏빛이 돈다. 바깥쪽 조각은 달걀 같은 창 모양이며, 가운데 조각 및 안쪽 조각과 더불어 끝이 뭉뚝하다.</p> <p>열매는 수과고 검은색이다. 또한 양 끝이 뿔뚝하고 평평하며, 긴 타원 모양이다. 열매 위쪽 끝부분에 나온 털 뭉치는 하얀색이다.</p> <p>줄기는 털이 없으며 가지가 조금 있다.</p>