



: 2026 1 17 5:31



작은돌기꽃구름버섯 / *Crustomyces subabruptus* (Bourdot & Galzin) Julich

| 구분 | 설명 |
|------|----------|
| 생물분류 | 버섯 |
| 속국명 | 돌기꽃구름버섯속 |
| 과국명 | 돌기꽃구름버섯과 |

| | |
|------|--|
| 과명 | Cystostereaceae |
| 일반특징 | <p>버섯의 자실체는 크게 갓, 주름, 대로 나누어진다. 작은돌기꽃구름버섯의 갓은 편평하게 넓어진 성질을 가지며, 초기에는 원모양이다가 서로 합류하여 넓게 자라며 견고하게 붙는다. 대백색이나 담황백색이다. 그 조직은 처음에는 매끈하고, 나중에는 거칠게 변한다.</p> <p>주름의 표면은 미세하게 뾰족한 모양이다. 뾰족한 부분은 짧고 원뿔 모양에서 원통 모양이며 빽빽하다.</p> <p>참나무, 단풍나무 기부 껍질, 죽은 물푸레나무, 살아있는 활엽수 밑동, 활엽수 죽은 가지, 활엽수 낙지에서 발생한다.</p> <p>분포지역 : 봉화산, 내장산, 명지산, 가야산, 주왕산</p> <p>발생계절 : 여름, 가을</p> |