



점나도나물 / *Cerastium holosteoides* var. *hallaisanense* (Nakai) Mizush.

구분	설명
생물분류	식물
속국명	점나도나물속
과국명	석죽과

과명	Caryophyllaceae
일반특징	<p>요약설명 : 석죽과 두해살이풀로 전국 각지에서 자란다. 분포지역 : 전국 각지에서 자란다. 형태 : 두해살이풀 크기 : 높이가 15-25cm로 자란다. 꽃색 : 백색 개화기 : 6월,5월,7월 잎은 마주나기하고 잎자루가 거의 없다. 잎은 달걀 모양 또는 달걀 같은 창 모양이며 가장자리가 밋밋하다. 양 끝이 좁고 잔털이 퍼져 있다. 꽃은 5~7월에 하얀색으로 피고 줄기 끝에서 발달하는 취산꽃차례에 달린다. 꽃자루는 꽃이 핀 후 끝부분이 밑으로 굽는다. 꽃받침은 5개로 갈라지고 긴 타원 모양이다. 뒷면에 털이 있고 가장자리는 얇은 막처럼 되어 있다. 꽃잎은 5개이고 꽃받침과 길이가 거의 같으며 깊이 2개로 갈라진다. 수술은 10개이고 암술은 1개이며 달걀 같은 둥근 모양이다. 씨방 끝의 암술대는 5개로 갈라진다. 삭과는 원통 모양이고 수평으로 달린다. 꽃받침보다 훨씬 길고 연한 황갈색이며 끝에 10개의 톱니가 있다. 씨앗은 갈색이고 사마귀 같은 작은 돌기가 있다. 줄기는 뻣뻣하게 나오고 가지가 많이 갈라져서 비스듬하게 자란다. 흑자색을 띠고 잔털이 있으나 윗부분에는 분비샘이 발달한 털이 있다. 밭이나 들에서 자라며, 전체적으로 분비샘이 발달한 털이 있다.</p>