



거미고사리 / *Asplenium ruprechtii* Sa.Kurata

| 구분 | 설명 |
|------|--------|
| 생물분류 | 식물 |
| 속국명 | 꼬리고사리속 |
| 과국명 | 꼬리고사리과 |

| | |
|------|--|
| 과명 | Aspleniaceae |
| 일반특징 | <p>요약설명 : 꼬리고사리과 상록성 다년초로 제주를 제외한 거의 전도에 나며 일본, 중국, 만주, 우수리, 러시아에 분포한다.</p> <p>분포지역 : 제주를 제외한 거의 전도에 나며 일본, 중국, 만주, 우수리, 러시아에 분포한다.</p> <p>형태 : 상록성 다년초</p> <p>크기 : 높이는 2m 정도 자란다.</p> <p>꽃색 : 백색</p> <p>개화기 : 6월</p> <p>양지바른 석회암 땅이나 길가 돌담에 자란다.</p> <p>뿌리줄기는 짧고 비스듬히 또는 곧게 자란다.</p> <p>잎은 모여나기한다. 잎자루는 연한 갈색이며 아랫쪽이 자주색을 띠기도 한다. 잎몸은 밑이 썩기모양이고 윗부분이 가늘어져 길게 된다. 잎 끝에 살눈을 형성하고 잎맥은 그물눈을 만든다. 표면은 녹색이고 가장자리는 밋밋하거나 불규칙한 물결모양이다.</p> <p>포자낭군은 줄 모양 또는 길쭉한 타원 모양으로 가운데맥 양쪽 잎맥 위에 달리고 얇은 막으로 덮여 있다.</p> |