



젓가락나물 / *Ranunculus chinensis* Bunge

구분	설명
생물분류	식물
속국명	미나리아재비속
과국명	미나리아재비과
과명	Ranunculaceae
일반특징	<p>요약설명 : 미나리아재비과 2년생 초본으로 전국 각지에서 자란다. 중국, 몽골, 일본, 러시아 극동부, 중앙아시아에 분포한다.</p> <p>분포지역 : ▶한국, 중국, 몽골, 일본, 러시아 극동부, 중앙아시아에 분포한다.▶전국 각지에서 자란다.</p> <p>형태 : 2년생 초본</p> <p>크기 : 높이 40~80cm 정도로 자란다.</p> <p>꽃색 : 노란색</p> <p>개화기 : 6월</p> <p>뿌리잎은 잎자루가 길며 삼출엽잎이다. 위로 갈수록 잎자루가 짧아지고, 잎도 작아지며 3개로 완전히 갈라진다. 작은 잎은 3개로 깊게 갈라지고, 갈라진 조각은 다시금 2~3개로 갈라진다. 맨 나중 조각은 거꿀피침모양 예두이고, 뾰족한 톱니가 있으며 양면에 갈라진 털이 있다.</p> <p>꽃은 6월에 노란색으로 피고 줄기나 가지 끝의 취산꽃차례로 달린다.</p> <p>꽃자루에 갈라진 털이 있다. 꽃받침조각은 5개이고 좁은 달걀 모양이며 아래로 젖혀진다. 뒷면에는 역센 털이 있다. 꽃잎도 이와 비슷하며 수평으로 퍼지고 밑부분에 작은 비늘조각이 있다. 수술과 암술은 여러 개이고 암술대는 짧으며 곧다.</p> <p>열매는 수과고 타원 모양이며 양쪽 가장자리 근처에 희미하게 모가 진 선이 있다. 여러 개가 꽃턱에 달려 긴 타원 모양의 취과를 이루며 6~7월에 익는다. 꽃턱에는 하얀 털이 있다.</p> <p>줄기는 곧게 서고 전체적으로 퍼진 털이 있으며 가지가 많이 갈라진다. 속은 비어 있다.</p> <p>뿌리줄기는 짧고 끝에 뿌리에서 난 잎이 뭉쳐 있다.</p> <p>햇볕이 잘 드는 습지에서 잡초로 자란다.</p>