



제비꼬리고사리 / *Thelypteris esquirolii* var. *glabrata* (Christ) K.Iwats.

구분	설명
생물분류	식물
속국명	처녀고사리속
과국명	면마과

과명	Dryopteridaceae
일반특징	<p>요약설명 : 면마과이고 난지에서는 상록성이다. 제주도에 나며 일본, 대만, 중국, 필리핀, 동남아시아, 히말라야에 분포한다.</p> <p>분포지역 : 제주에 나며 일본, 대만, 중국, 필리핀, 동남아시아, 히말라야에 분포한다.</p> <p>형태 : 난지에서는 상록이다.</p> <p>크기 : 높이 60cm</p> <p>꽃색 : 파란색, 자주색</p> <p>개화기 : 7월, 8월</p> <p>잎자루는 밑부분에 달걀 모양인 흑갈색 비늘조각이 있지만 일찍 떨어진다. 잎몸은 긴 타원 모양이며, 2회 깃털 모양으로 갈라진다. 끝이 뾰족하고 밝은 초록색이다. 깃조각은 넓은 선 모양이고 끝이 꼬리처럼 길게 뾰족하다. 밑부분에는 짧은 돌기가 있으나 표본에서는 거의 확인되지 않는다. 아랫부분에 있는 몇 쌍의 깃조각은 흔적처럼 작아진다. 굵은 맥에 털이 촘촘하게 나 있다.</p> <p>흩씨주머니 무리는 가장자리 가까이에 나고, 흩씨주머니 무리를 덮고 있는 막은 둥근 콩팥 모양이다.</p> <p>뿌리줄기는 짧게 뻗는다.</p> <p>산지의 숲 속에서 자란다.</p>