

: 2026 1 16 7:06



제이줄나비 / *Limenitis doerriesi* Staudinger, 1892

구분	설명
생물분류	곤충
속국명	줄나비속
과국명	네발나비과

과명	Nymphalidae
일반특징	<p>무늬나 날개 모양으로 암수 구별은 어렵기 때문에 배 끝을 봐야 알 수 있다. 제일줄나비와 비슷하게 생겼으나 다음과 같은 차이점이 있다. 제이줄나비는 뒷날개의 아랫면 가장자리에 흰 띠가 있고, 그 안쪽에 검은 점이 있다. 또한 앞날개가 시작되는 부분에서 시작하여 가운데로 향하는 하얀색 곤봉 모양의 길이가 짧다.</p> <p>암컷은 오후에 먹이 식물 잎 뒷면에 알을 하나씩 낳는다. 제일줄나비보다 분포 범위가 좁지만 서식 장소는 같다. 계곡의 습한 곳에 잘 모이며 산초나무, 조팝나무의 꽃에서 꿀을 먹고, 짐승의 똥에도 잘 모인다. 일광욕을 할 때에는 날개를 펴고 앉으나 습지나 꽃에 앉을 때에는 날개를 펴다 접었다 한다. 애벌레의 모습으로 겨울을 난다.</p>