



: 2026 1 19 5:43



조릿대 / *Sasa borealis* (Hack.) Makino

구분	설명
생물분류	식물
속국명	조릿대속
과국명	벼과

과명	Gramineae
일반특징	<p>요약설명 : 벼과 상록 활엽 관목으로 제주도와 울릉도를 제외한 한반도 전역에서 자란다. 일본에도 분포한다.</p> <p>분포지역 : 일본; 한반도 전역 (제주도와 울릉도 제외).</p> <p>형태 : 상록 활엽 관목.</p> <p>크기 : 높이 1 ~ 2m.</p> <p>꽃색 : 자주색</p> <p>개화기 : 4월</p> <p>잎은 가지 끝에서 2~3개씩 나고 긴 타원 같은 창 모양이다. 점첨두이거나 꼬리처럼 길고 급하게 뾰족한 모양이다. 양면에 털이 없거나 뒷면 밑부분에 털이 있다. 가장자리에는 가시 같은 작은 톱니가 있으며 잎집에 털이 있다. 꽃차례는 털과 하얀 가루로 덮였고 꽃이나 쌍을 보호하는 자주색 잎이 아랫부분을 감싸고 있다. 작은이삭은 2~5개의 꽃으로 구성되며 밑부분에 작은 잎 같은 구조가 2개 있다. 첫째 포영은 부드러운 털이 있고 뾰족하지만 까락같지 않다. 둘째 포영은 뒷면에 흄이 있으며 내영은 3개이다.</p> <p>열매는 영과이고 밀알 같으며 껍질이 두껍다. 5월~6월에 익는다.</p> <p>줄기는 털이 없고 초록색이다. 마디는 둥근 공 모양처럼 도드라지고 주위가 약간 자주색이다.</p> <p>뿌리줄기가 있다.</p> <p>음지에서도 잘 자라고 추위에 강하다. 수분이 적당하고 기름진 땅, 진흙이 비교적 적게 섞인 보드라운 흙을 좋아한다. 대기오염과 염분에 대해 저항성이 있다. 건조에는 약하지만 줄기가 훼손되었을 때 새로운 줄기를 만들어내는 능력이 뛰어나다. 포기나누기를 하거나 땅속줄기를 끊어서 심는 등의 방법으로 번식시킨다. 항상 푸른 성질이기 때문에 겨울의 경관을 아름답게 장식한다.</p>