



: 2026 1 19 8:52



조밥나물 / *Hieracium umbellatum* L.

| 구분 | 설명 |
|------|-------|
| 생물분류 | 식물 |
| 속국명 | 조밥나물속 |
| 과국명 | 국화과 |

| | |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 과명 | Compositae |
| 일반특징 | <p>요약설명 : 국화과 여러해살이풀로 전국 각지에서 자라며 북반구의 온대에 널리 퍼져 있다.</p> <p>분포지역 : ►북반구의 온대에 널리 있다.►전국에 분포한다.</p> <p>형태 : 여러해살이풀</p> <p>크기 : 높이 30-100cm이다.</p> <p>꽃색 : 노란색</p> <p>개화기 : 8월, 10월, 7월, 9월</p> <p>뿌리에서 난 잎은 꽃이 필 때 없어진다. 줄기잎은 어긋나며 꽃이 필 때 밑부분의 잎이 말라버린다. 가운데 달린 잎은 선 같은 창 모양 또는 창 모양이며 약간 두껍고 거칠다. 또한 끝이 뾰족하고 밑부분이 좁아져서 원줄기에 달린다. 가장자리에 뾰족한 톱니가 약간 있고 뒷면 맥줄에 잔털이 있다.</p> <p>꽃은 7~10월에 피고 가지 끝에 편평꽃차례처럼 달린다. 꽃자루에는 짧은 털이 조금 있다. 총포조각은 3~4줄로 배열된다. 초록색 또는 붉은빛이 도는 초록색이다. 바깥쪽 조각은 점점 짧아지며 끝이 뾰족한 창 모양이다. 안쪽 조각은 긴 타원 같은 창 모양이다. 꽃은 모두 혀꽃이고 노란색이다. 꽃잎 전체는 끝부분이 5개로 나누며 판통에 털이 있다.</p> <p>열매는 수과이고 거꿀피침모양이며 검은색이다. 모가 진 선이 10개 있다.</p> <p>열매 위쪽 끝 부분에 있는 털 뭉치는 갈색이며, 열매는 8~9월에 익는다.</p> <p>줄기는 곧게 서고 하나이며 잔털이 있다. 윗부분에서 가지가 조금 갈라진다.</p> <p>숙의 가장자리나 습지에서 자란다.</p> |