

## \_어린이 생물도감

: 2026 1 18 8:17



족제비고사리 / *Dryopteris varia* (L.) Kuntze

| 구분   | 설명  |
|------|-----|
| 생물분류 | 식물  |
| 속국명  | 관중속 |
| 과국명  | 면마과 |

|      |  |
|------|--|
| 과명   | Dryopteridaceae  |
| 일반특징 | <p>요약설명 : 면마과 상록성 다년초로 우리나라의 제주도에서 자란다. 일본, 대만, 중국, 필리핀, 인도, 인도차이나에 분포한다.</p> <p>분포지역 : 제주에 나며 일본, 대만, 중국, 필리핀, 인도, 인도지나에 분포한다.</p> <p>형태 : 상록성 다년초</p> <p>크기 : 높이 1.5 ~ 2m.</p> <p>꽃색 : 백색</p> <p>개화기 : 5월, 4월</p> <p>잎자루는 밑부분에 창 모양이면서 적갈색을 띤 비늘조각이 촘촘하게 달려 있다. 위로 갈수록 가늘어지며 떨어지기 쉽다. 잎몸은 넓은 달걀 모양 또는 오각의 넓은 달걀 모양이며 2회 깃털 모양으로 갈라진다. 끝이 급하게 좁아져서 꼬리처럼 된다. 깃조각은 선 같은 창 모양이고 대가 있으며 점점 좁아져서 길게 뾰족하다. 맨 나중의 깃조각 뒤쪽 밑부분에 있는 잔깃조각 2~4개는 눈에 띄게 길다. 잔깃조각은 텁니가 없거나 작은 텁니가 있다.</p> <p>홀씨주머니 무리는 굵은 맥과 가장자리 중간에 나며, 홀씨주머니 무리를 덮고 있는 막은 둥근 콩팥모양이다.</p> <p>잎자루와 큰 잎자루의 비늘조각이 비스듬하게 나고, 흑갈색을 띈다. 밑부분이 갈색이거나 드물게 전체가 갈색이다.</p> <p>뿌리줄기는 약간 굵고 비스듬히 서며 잎이 모여나기한다.</p> <p>바닷가 가까이의 해가 잘 드는 곳에서 자란다.</p> |