



: 2026 1 16 6:43



졸방제비꽃 / *Viola acuminata* Ledeb.

구분	설명
생물분류	식물
속국명	제비꽃속
과국명	제비꽃과

과명	Violaceae
일반특징	<p>요약설명 : 제비꽃과 여리해살이풀로 한국, 중국, 일본, 러시아에 분포한다. 분포지역 : 한국, 중국, 일본, 러시아에 분포한다. 형태 : 여리해살이풀 크기 : 높이가 20-40cm 정도로 자란다. 꽃색 : 백색, 자주색 개화기 : 6월, 5월 잎은 어긋나고 세모난 심장 모양이며 잎자루가 있다. 윗부분의 잎은 폭이 길이보다 짧고 끝이 점점 길게 뾰족해진다. 가장자리에 둥똑한 톱니가 있다. 턱잎은 긴 타원 모양이고 빗살 같은 톱니가 있다. 5~6월에 원줄기 윗부분의 잎겨드랑이에서 꽃자루가 나온다. 하얀색 또는 연한 자줏빛이 도는 꽃이 옆을 향해 달린다. 또한 꽃자루 윗부분에 꽃을 보호하는 선모양의 잎이 달린다. 꽃잎 전체는 입술 모양이며, 하얀색 바탕에 자주색 줄이 있다. 꽃받침조각은 초록색이고 가장자리는 빛나거나 오그라들며 톱니가 있다. 옆쪽 꽃잎의 안쪽에 수염털이 있으며 꿀주머니가 있다. 열매는 삭과이고 타원 모양이며 털이 없다. 줄기는 몇 대가 뭉쳐나며 털이 없거나 윗부분에 있다. 뿌리줄기는 짧고 굵으며 황백색 또는 갈색의 뿌리가 난다. 산기슭의 양지에서 자란다.</p>