

 어린이 생물도감

: 2026 5 27 1:20



2012년도 식물·곤충
표본정보DB구축사업

Korea National Herbarium (KH)
Fimbristylis aestivalis (Retz.) Vahl
Cyperaceae 좁민하늘지기?
Park, Soo-Hyun Jun. 16. 2009



KOREA NATIONAL HERBARIUM (KH)	
Jul 22 2008	Flora of Korea
ESJeon80813	
<i>Fimbristylis dichotoma</i> (L.) Vahl	
Cyperaceae	하늘지기
loc. The civilian passage restriction line, Yuok-ri, Geumbak-myeon, Cheolwon-gun, Gangwon-do	
강원도 철원군 근축면 유곡리 민통선	
GPS 국가생물자원보호를 위해 상세좌표값은 차감되었습니다.	
alt.	
note.	
col. Jeon,Eur-Sik;Park,Yong-Seok	
det. Jeon,Eur-Sik	
Distribution of the Korean Native Species, 2008	

좁민하늘지기 / *Fimbristylis aestivalis* (Retz.) Vahl

구분	설명
생물분류	식물
속국명	하늘지기속
과국명	사초과
과명	Cyperaceae
일반특징	<p>요약설명 : 사초과 한해살이풀로 식물체는 포기져 나며 땅속줄기는 없고 수염뿌리가 내린다. 한반도의 남부와 중부에서 자라며, 중국, 러시아, 일본, 동남아시아, 인도에도 분포한다.</p> <p>분포지역 : 한반도 (남부, 중부), 중국, 러시아, 일본, 동남아시아, 인디아</p> <p>형태 : 한해살이풀이다. 식물체는 포기져 나며 땅속줄기는 없고 수염뿌리가 내린다.</p> <p>크기 : 높이는 5~15cm이다.</p> <p>꽃색 : 갈색</p> <p>개화기 : 5월, 6월</p> <p>잎은 줄기보다 짧고 좁은 줄모양이다. 가장자리는 안으로 조금 말려 있다. 앞, 뒷면에 털이 드문드문 있다. 잎집은 짧고 연한 쇠녹색이다. 겉면에 긴 털이 있다.</p> <p>꽃이나 싹을 보호하는 잎과 같은 구조는 3~5개이고 좁은 선 모양이다. 긴 것은 거의 꽃차례와 비슷하거나 조금 짧다. 털이 드문드문 있다. 꽃차례는 1~2회 우산 모양으로 갈라진다. 길이가 서로 다른 3~7개의 꽃대 끝에 1개 또는 여러 개의 작은 이삭이 달린다. 그중 한 개의 작은 이삭에는 꼭지가 없다. 작은 이삭은 달걀 모양, 길고 둥근 달걀 모양 또는 선 같은 타원 모양이다. 모가 져 있으며 많은 꽃이 핀다. 비늘조각은 소라 모양처럼 붙으며 긴 타원 모양이거나 달걀 모양이다. 또한 윗부분이 둥글며 연한 갈색을 띠고 3개의 줄이 있다. 가운데 줄의 끝은 짧게 도드라진 가시로 되어있다.</p> <p>열매는 거꿀달걀모양이며 앞뒤가 볼록하다. 윤기가 나는 노란색을 띠고 매끈하다. 육각형의 그물 무늬가 있다.</p> <p>줄기는 가늘고 납작하다. 매끈하고 세모난 모양이다. 밑부분에 몇 개의 잎이 있다.</p> <p>논이나 햇볕이 잘 드는 질퍽한 벌, 물가에서 자란다.</p>