



좁보리풀 / *Hordeum pusillum* Nutt.

구분	설명
생물분류	식물
속국명	보리속
과국명	벼과

과명	Gramineae
일반특징	<p>요약설명 : 벼과 한해살이풀로 우리나라의 제주도 중문 관광 단지와 중문 사이의 다리 밑 해변에서 채집하였다. 유럽, 일본에 귀화되었다.</p> <p>분포지역 : 유럽, 일본에 귀화되었다.▶제주도 중문 관광 단지와 중문 사이의 다리밑 해변에서 채집하였다.</p> <p>형태 : 한해살이풀이다.</p> <p>크기 : 높이 20-40cm이다.</p> <p>꽃색 : 갈색</p> <p>개화기 : 5월</p> <p>잎집은 줄기의 마디 사이 길이보다 짧고 털이 없으며 등이 둥글다. 잎몸과 잎집 사이에 붙어 있는 귀 모양의 돌기는 거의 없으며, 혀 모양의 돌기는 하얀색의 얇은 막처럼 되어 있다.</p> <p>꽃은 5월에 피고, 작은 이삭이 촘촘하게 모여며 곧게 선다. 작은 이삭은 각 마디에 3개씩 붙어 있다. 그중 가운데 것은 자루가 없고 암술과 수술을 모두 갖고 있는 양성꽃이다. 옆에 있는 2개의 작은 이삭은 자루가 있고 씨앗을 만들지 못하며 모두 1개의 낱꽃과 2개의 포영이 있다. 양성꽃은 포영이 창 모양이며 끝에 까락이 있다. 호영은 달걀 같은 창 모양이고 5개의 맥이 있으며 까락이 있다. 씨앗을 맺지 못하는 작은 이삭은 제 1포영이 좁은 창 모양이고 까락이 있다. 제 2포영은 밑에서부터 까락이 된다. 호영은 달걀 같은 창 모양으로 까락이 없다.</p> <p>줄기는 여러 개가 모여 나고 곧게 자란다. 털이 없으며 3개 내외의 마디가 있다.</p> <p>보리풀보다 작아서 “좀보리풀”이라고 불린다.</p>