

## \_어린이 생물도감

: 2026 1 18 9:28



주홍서나물 / *Crassocephalum crepidioides* (Benth.) S.Moore

구분	설명
생물분류	식물
속국명	주홍서나물속
과국명	국화과

과명	Compositae
일반특징	<p>요약설명 : 국화과 한해살이풀로 제주도와 남부지방에 분포한다.</p> <p>분포지역 : 제주도와 남부지방에 분포한다.</p> <p>형태 : 한해살이풀</p> <p>크기 : 높이 30-70cm</p> <p>꽃색 : 백색, 붉은색</p> <p>개화기 : 8월, 9월, 7월</p> <p>잎은 어긋나고 잎자루가 있다. 아래쪽의 잎은 불규칙하게 깃털 모양으로 갈라진다. 또한, 달걀 모양 또는 긴 타원 모양이며 양 끝이 예두이다. 가장자리에는 크기가 다른 톱니가 있으며 양면에는 드문드문 털이 있다. 위쪽의 잎은 좁고 긴 타원 모양이며 양 끝이 길고 뾰족하다. 듬성듬성 톱니가 있다.</p> <p>꽃은 7~9월에 피고, 머리모양꽃차례는 모두 아래를 향하여 매달리며 총상꽃차례를 이룬다. 총포는 원통 모양이며 밑부분 근처가 뚜렷하게 부풀어있다. 바깥쪽 총포 조각은 선 모양이고, 안쪽 총포 조각도 선모양이며 한 줄로 배열된다. 혀꽃은 없고 통 모양의 꽃은 긴 관처럼 생겼으며 판통은 하얀색이다. 판연은 붉은색이며 5개로 갈라진다. 씨방 위쪽에 달리는 털 모양의 돌기는 하얀색이며 판통보다 짧다. 암술머리는 2개로 갈라지고 끈모양이며 끝이 가늘어진다.</p> <p>줄기는 곧게 서고 연약하며 가지가 갈라져 나온다. 또한, 털이 드문드문 있다.</p> <p>1950년대 일본에도 귀화되었다. 국내에서는 1991년 전의식 씨에 의하여 남해도, 제주도, 부산에서 채집되어 보고된 바 있다.</p>