



쥐꼬리풀 / *Aletris spicata* (Thunb.) Franch.

구분	설명
생물분류	식물
속국명	쥐꼬리풀속
과국명	백합과

과명	Liliaceae
일반특징	<p>요약설명 : 백합과 여러해살이풀로 전라남도의 다도해, 안면도에서 자란다. 분포지역 : 전남(다도해, 안면도)에서 자란다. 형태 : 여러해살이풀 크기 : 꽃대는 높이 30-50cm. 꽃색 : 붉은색, 백색 개화기 : 6월, 7월 잎은 모여나기하고 선모양이며, 3개의 맥이 뚜렷하다. 꽃은 6~7월에 피고 통 같은 모양이다. 밑부분이 합쳐져 씨방에 붙는다. 겉에 잔털이 있고 윗부분이 6개로 갈라진다. 꽃대에는 꼬부라진 하얀 털이 있으며 몇 개의 작은 잎이 달린다. 이삭꽃차례에 달린 꽃이나 싹을 보호하는 잎과 같은 구조는 꽃보다 길거나 짧고 선모양이다. 꽃덮이조각도 선모양이고 연한 붉은색이다. 씨방은 꽃받침 밑에 있으며, 6개의 수술은 꽃덮이보다 훨씬 짧다. 암술대는 가늘고 곧게 선다. 열매는 삭과고 타원 모양이다. 끝에 마른 꽃이 남아 있으며 씨앗은 퉁밥 같다. 뿌리줄기는 굵고 짧다. 따뜻한 곳의 산기슭에서 자란다.</p>