



쥐털이슬 / *Circaea alpina* L.

구분	설명
생물분류	식물
속국명	털이슬속
과국명	바늘꽃과

<p>과명</p>	<p>Onagraceae</p>
<p>일반특징</p>	<p> 요약설명 : 바늘꽃과 여러해살이풀로 한국, 중국, 일본, 러시아 극동부에 분포한다. 분포지역 : 한국, 중국, 일본, 러시아 극동부에 분포한다. 형태 : 여러해살이풀 크기 : 높이가 5-15cm정도로 자란다. 꽃색 : 붉은색, 백색 개화기 : 8월, 7월 잎은 마주나고 세모난 심장 모양 또는 달걀 모양이다. 예두고 밑부분은 얇은 심장저거나 심장저와 비슷하다. 겉면과 가장자리에 잔털이 있고 뾰족한 톱니가 조금 있다. 잎자루에는 날개가 있고 붉은빛이 돈다. 꽃은 7~8월에 홍백색으로 피고 줄기나 가지 끝의 총상꽃차례에 달린다. 꽃차례는 꽃이 진 다음 자라고 털이 없다. 꽃받침조각은 2개이고 붉은빛을 띤다. 꽃잎도 2개이고 하얀색이며, 거꿀달걀모양으로 끝이 오목하다. 꽃받침보다 조금 짧다. 수술은 2개, 암술은 1개이고 씨방은 꽃받침 밑에 있으며 갈고리 같은 털로 덮여 있다. 열매는 단단한 껍질에 싸여 있고 거꿀달걀모양이다. 갈고리 가시가 있고 작은 열매자루가 있다. 줄기는 곧게 서고 가늘다. 전체적으로 붉은빛을 띠며 털이 없고 밑부분에서 실 같은 기는줄기가 자란다. 그 끝에 겨울눈이 생긴다. 깊은 산지역의 그늘지고 습한 곳에서 자란다. 세계에 약 12종이 있으며 우리나라에는 4종이 분포한다. </p>