



: 2026 1 16 5:26



지리대사초 / *Carex okamotoi* Ohwi

구분	설명
생물분류	식물
속국명	사초속
과국명	사초과
과명	Cyperaceae
일반특징	<p>요약설명 : 사초과 여러해살이풀로 우리나라 중부지방을 기준으로 한 남쪽 지역에서 자란다.</p> <p>분포지역 : 중부 이남에서 자란다.</p> <p>형태 : 여러해살이풀</p> <p>크기 : 꽃대는 높이 15~20cm이다.</p> <p>꽃색 : 녹색</p> <p>개화기 : 6월, 5월, 4월</p> <p>잎은 꽂자루보다 길고 뒤로 젖혀진다. 넓은 선모양이고 평평하다. 겉면은 황록색, 뒷면은 하얀색을 띈다. 잎집과 잎몸 사이에 생기는 혀 모양의 돌기는 위쪽이 갈라진다. 잎집은 갈색이다.</p> <p>꽃대는 가늘고 둔하게 세모나며 깊은 틈이 있다. 작은 이삭은 4~5개가 떨어져 달려있다. 꽃대기에 달린 작은 이삭은 수꽃이며 거꿀피침모양이다. 옆쪽 작은 이삭은 선 같은 긴 타원 모양이며 꽂자루가 길고 수꽃과 암꽃이 달리는데, 암꽃은 적으며 드문드문 달린다. 암꽃은 밑에, 수꽃은 위에 달린다. 꽃이나 쌍을 보호하는 잎은 초록색이고 끝이 거의 잎 같지 않다. 암꽃 밑에 있는 두 개의 작은 잎은 타원 모양이고 색이 연하며 뒷면에 3개의 맥이 있다. 암술대는 밑부분이 굽고 암술머리는 3개이다.</p> <p>열매를 싸고 있는 주머니는 넓은 거꿀달걀모양이고 회녹색이며, 거의 곧게 선다. 얇은 막처럼 되어 있으며 평평하고 넓다. 또한 털이 없고 맥이 있으며 양 끝이 좁다. 부리는 끝부분이 하얀색이고 깊은 틈이 있고, 갑자기 좁아진다. 수과는 넓은 타원 모양이며 털이 없다.</p> <p>뿌리줄기는 가늘게 옆으로 뻗는다.</p> <p>낙엽나무 숲의 밑부분, 숲의 가장자리에서 자란다. 기는 줄기가 왕성하게 뻗어 나가므로 포기 나누기에 의해 쉽게 번식이 가능하다. 잎 가장자리에 흰 줄무늬가 들어간 변이종이 발견되었으며 원예종으로 높은 가치가 기대된다.</p> <p>국내에서만 나고 자라는 특산 식물이다.</p>