



진퍼리고사리 / *Stegnogramma pozoi* subsp. *mollissima* (Fisch. ex Kunze)
K.Iwats.

구분	설명
생물분류	식물
속국명	진퍼리고사리속
과국명	면마과

과명	Dryopteridaceae
일반특징	<p>요약설명 : 면마과 상록성 다년초로 제주도와 경상북도 울릉도에서 자란다. 일본, 대만, 중국, 인도, 스리랑카에도 분포한다.</p> <p>분포지역 : 제주, 경북(울릉도)에 나며 일본, 대만, 중국, 인도, 스리랑카에 분포한다.</p> <p>형태 : 상록성인 다년초</p> <p>크기 : 높이 5.5cm정도 이다.</p> <p>꽃색 : 백색, 자주색, 녹색</p> <p>개화기 : 8월</p> <p>잎자루의 밑부분은 갈색을 띠고 털이 촘촘히 나 있으며 비늘조각이 드문드문 난다. 잎몸은 긴 타원 같은 창 모양이며 1회 깃털 모양으로 갈라지고 끝이 좁아져 뾰족하다. 깃조각은 다시 깃털 모양으로 깊게 갈라지고 선 같은 창 모양이며 끝이 뾰족하고 대가 없다. 갈라진 조각은 끝이 뭉툭하거나 뾰족하고, 큰 것은 무딘 톱니가 있으며 잎맥은 따로 떨어진다.</p> <p>흩씨주머니 무리는 긴 타원 모양이고 5개 정도의 털이 있으며 굵은 맥의 양쪽에 달린다. 흩씨주머니를 덮고 있는 막은 없다.</p> <p>줄기는 전체에 털이 있다.</p> <p>뿌리줄기는 길게 뻗으며 잎은 가까이 난다.</p> <p>들의 습지에서 자란다.</p>