

: 2026 5 27 10:01



0014738



Flora of Korea
Cyperaceae
Carex vaginata var. *petersii* (C. A. Mey. ex F. Schmidt) Akiyama
Local Name 집사초
Mt. Tae-ye, Sap-gyo-ri, Dun-nae-myeon, Hoeng-seong-gun, Gang-won-do
국립생물자원관을 위해 장대씨목본을 기탁하였습니다.
태기산 남사능선, 5면 중턱평탄소 서쪽 경사
Seong-Hyun Cho, Yung-in Kim
YangdongKIM, IG-2009-0467
22 May, 2009
Herbarium of Hallam University (HUKU)

집사초 / *Carex vaginata* var. *petersii* (C.A.Mey.) Akiyama

구분	설명
생물분류	식물
속국명	사초속
과국명	사초과
과명	Cyperaceae
일반특징	<p>요약설명 : 사초과 여러해살이풀로 우리나라의 북부지방에서 자란다. 분포지역 : 북부지방에서 자란다. 형태 : 여러해살이풀 크기 : 높이는 20-50cm 꽃색 : 갈색 개화기 : 6월,7월</p> <p>잎은 납작하고 밝은 초록색이며 꽃대보다 짧다. 밑부분의 잎집은 잎이 없고 연한 갈색이지만 일부분에 적자색이 돌며 섬유처럼 가늘게 갈라진다. 작은 이삭은 2~4개가 서로 떨어져서 곧게 선다. 꼭대기의 작은 이삭은 수꽃이며 넓은 선모양이고 대가 있다. 꽃은 밑으로 갈수록 드문드문 달린다. 암꽃 밑에 달린 2개의 작은 잎은 달걀 모양이며 짙은 갈색이 도는 진한 붉은색이거나 검은 적자색이다. 끝이 둔두 또는 예두며 뒷면 녹색 부분에 1개의 맥이 있다. 암술대는 곧고 밑부분이 약간 굽으며 끝이 3개로 갈라진다. 열매를 싸고 있는 주머니는 포영보다 길고 비스듬하게 달리며 황록색에서 갈색으로 변한다. 또한 털이 없고 맥이 많으며 세모난 달걀 모양이다. 부리 끝은 진한 갈색을 띠며 2개로 갈라지지만 한쪽이 더 많이 파여 있다. 수과는 험겁게 들어 있고 세모난 거꿀달걀모양이다. 줄기는 가늘게 뻗는 것이 있어 그리 모여나지는 않는다. 산지의 습한 풀밭에서 자란다.</p>