



쪽동백나무 / *Styrax obassia* Siebold & Zucc.

구분	설명
생물분류	식물
속국명	때죽나무속

과국명	때죽나무과
과명	Styracaceae
일반특징	<p>요약설명 : 때죽나무과 낙엽 활엽 소교목으로 함경남도와 전라도를 제외한 전국에서 자라며, 중국과 일본에도 분포한다.</p> <p>분포지역 : 중국, 일본; 함경남도와 전라남북도를 제외한 전국 분포.</p> <p>형태 : 낙엽 활엽 소교목.</p> <p>크기 : 높이 10m.</p> <p>꽃색 : 백색</p> <p>개화기 : 6월, 5월</p> <p>잎은 어긋나고 타원 모양 또는 달걀 같은 둥근 모양이며 급한 점첨두, 원저이다. 윗부분에 작은 톱니가 있다. 겉면의 맥 위에 털이 있으며 뒷면은 하얀빛이 돌고 별모양 털이 있다. 가장자리에 날카로운 톱니가 있거나 없으며 잎자루가 있다.</p> <p>꽃은 5~6월에 하얀색으로 피고 총상꽃차례를 이룬다. 꽃차례는 아래로 처지고 꽃받침은 5~9개이다. 꽃잎 전체는 5개로 깊게 갈라진다.</p> <p>열매는 핵과이고 타원 모양이며 9월에 익는다. 별모양 털이 촘촘히 나 있고 열매껍질은 불규칙하게 갈라진다.</p> <p>가운데 굵고 튼튼한 원뿌리와 곁뿌리가 있다.</p> <p>나무껍질은 검은색이며 굴곡이 있고 매끈하다.</p> <p>땅의 깊이가 깊은 곳, 기름지고 다소 습하지만 물빠짐이 좋은 곳, 비교적 진흙이 적게 섞인 보드라운 흙에서 잘 자란다. 추위에 강하여 전국 어디서나 겨울을 보낸다. 바닷가에서도 잘 견디고 그늘과 병충해, 대기오염에도 강하므로 도시의 중심에 심는 것도 가능하다. 씨앗을 뿌리거나 꺾꽂이를 하여 번식시킨다. 전체적인 나무의 모습이 원뿔처럼 생겼으며 특색있는 줄기, 아름다운 꽃, 귀여운 열매는 관상 가치가 크다.</p>