



처녀고사리 / *Thelypteris palustris* Schott

| 구분 | 설명 |
|------|--------|
| 생물분류 | 식물 |
| 속국명 | 처녀고사리속 |
| 과국명 | 면마과 |

| | |
|------|--|
| 과명 | Dryopteridaceae |
| 일반특징 | <p>요약설명 : 면마과 여러해살이풀로 거의 전국에서 나며 북반구 온대에 널리 분포한다.</p> <p>분포지역 : 거의 전국에 나며 북반구 온대에 널리 분포한다.</p> <p>형태 : 여러해살이풀이다.</p> <p>크기 : 높이가 20cm정도 된다.</p> <p>꽃색 : 자주색,노란색,백색,붉은색</p> <p>개화기 : 10월,7월,8월,9월</p> <p>흫씨가 달리는 잎이 길고 좁으며 갈라진 조각도 좁고 곧게 자란다. 광합성을 하는 영양잎은 옆으로 퍼지는 것도 있다. 잎자루는 흑록색 또는 적자색을 띠며 떨어지기 쉬운 비늘조각이 조금 있다. 잎몸은 창 모양이고 2회 깃털 모양으로 갈라진다. 잎 뒤에 털과 분비샘이 발달한 털이 있다. 깃조각은 선모양 또는 창 모양이고 끝이 뾰족하며 대가 거의 없다. 갈라진 조각은 달걀 모양이고 끝이 뾰족하며 뒤로 말려 있다. 작은 맥은 2개로 갈라지며 가장자리에 닿는다.</p> <p>흫씨주머니 무리는 굵은 맥 가까이에 달리고 둥근 콩팥 모양이다. 털이 촘촘히 나 있으나 일찍 떨어진다.</p> <p>뿌리줄기는 옆으로 길게 뻗으며 다른 모양의 잎이 섞여 드문드문 난다. 햇별이 잘 드는 습지에서 자란다.</p> |