



천일사초 / *Carex scabrifolia* Steud.

| 구분 | 설명 |
|------|-----|
| 생물분류 | 식물 |
| 속국명 | 사초속 |
| 과국명 | 사초과 |

| | |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 과명 | Cyperaceae |
| 일반특징 | <p>요약설명 : 사초과 여러해살이풀로 제주도를 포함한 전국의 바닷가에서 자란다.</p> <p>분포지역 : 제주도를 포함한 전국의 바닷가에 분포한다.</p> <p>형태 : 여러해살이풀이다.</p> <p>크기 : 높이 30~70cm이다.</p> <p>꽃색 : 갈색</p> <p>개화기 : 7월,5월,6월</p> <p>잎은 평평하고 밑부분의 잎집은 잎이 없고 적자색에서 자주색으로 되며 그물처럼 갈라진다. 꽃은 5~7월에 핀다. 작은 이삭은 3~5개인데, 그중 윗부분의 2~3개는 수꽃이고 가깝게 붙어 있으며 선 모양이다. 수술이 없는 작은 이삭은 1~2개가 밑부분에 달리고 긴 타원 모양이며 곧게 선다. 첫째 작은 이삭은 짧은 대가 있다. 첫째 포(꽃이나 싹을 보호하는 잎)은 꽃대보다 길지만 끝부분의 것은 매우 작다. 암꽃 밑에 달린 2개의 작은 잎은 달걀 같은 삼각형이며 끝이 뾰족하다. 또한 뒷면 녹색 부분에 3개의 맥이 있으며 구리색이다. 암술대는 밑부분이 굵고 끝이 3개로 갈라진다.</p> <p>열매를 싸고 있는 주머니는 포영보다 길고 비스듬하게 달리며 세모난 타원 모양이다. 연한 황갈색이고 밋밋하며 맥이 많다. 부리는 끝이 딱딱하며 2개로 갈라진다. 수과는 팽팽하게 들어 있고 세모난 타원 모양이다.</p> <p>뻗는 줄기가 길게 뻗는다. 세모나고 꺼칠꺼칠하다.</p> <p>바닷가, 바닷물과 합쳐지는 냇가의 습지, 강어귀의 갯벌에서 무리지어 자란다.</p> |