



칠보치마 / *Metanartheceum luteoviride* Maxim.

구분	설명
생물분류	식물
속국명	칠보치마속

과국명	백합과
과명	Liliaceae
일반특징	<p>요약설명 : 백합과 여러해살이풀로 우리나라의 경기도 수원시, 경상남도 남해군에서 자란다. 일본에도 분포한다.</p> <p>분포지역 : 일본 / 한국(경기도 수원시; 경상남도 남해군)</p> <p>형태 : 여러해살이풀</p> <p>크기 : 꽃대는 높이 20-40cm</p> <p>꽃색 : 노란색, 백색</p> <p>개화기 : 6월, 7월</p> <p>잎은 뿌리에서 10여 개가 나와 여러 방향으로 퍼진다. 황록색을 띠고 거꿀피침모양이다. 밑으로 갈수록 점점 좁아지고 끝부분은 갑자기 뾰족해진다. 10개 정도의 맥이 있다.</p> <p>꽃은 6~7월에 피고, 꽃대에 1~2개의 가지가 있으나 잎은 없다.</p> <p>이삭꽃차례는 잔털이 있고, 꽃을 보호하는 잎과 같은 구조는 선모양이다. 꽃덮이조각은 6개이고 창 모양이며 끝이 뾰족하고 황백색을 띤다. 수술은 6개이고 꽃덮이보다 짧다. 수술대는 밑부분이 약간 넓으며 꽃덮이에 붙어 있다. 씨방은 꽃받침 옆에 붙어 있다.</p> <p>열매는 삭과고 달걀 모양이며 암술대가 달려 있다. 꽃덮이도 남아서 열매를 둘러싸며, 씨앗은 달걀 모양이다.</p> <p>뿌리줄기는 짧고 곧다.</p> <p>수원 칠보산의 약간 습기가 있는 곳에서 처녀치마와 함께 자란다.</p>