



: 2026 1 19 7:30



큰꽃으아리 / *Clematis patens* C.Morren & Decne.

구분	설명
생물분류	식물
속국명	으아리속
과국명	미나리아재비과

과명	Ranunculaceae
	<p>요약설명 : 미나리아재비과 낙엽성 활엽 만경목으로 전국 각처 해발 100~850m 지역에서 자란다. 중국과 만주 등지에도 분포한다.</p> <p>분포지역 : ►중국과 만주 등지에도 자란다.►전국 각처 표고 100~850m지역에서 자란다.</p> <p>형태 : 낙엽성 활엽 만경목, 수형:덩굴식물</p> <p>크기 : 길이 2~4m이다.</p> <p>꽃색 : 노란색,백색</p> <p>개화기 : 6월,5월</p> <p>잎은 삼출겹잎 또는 깃모양겹잎이며 마주난다. 3~5개의 작은 잎은 달걀 모양 또는 달걀 같은 창 모양이다. 끝이 짧고 뾰족하거나 점첨두고 원저이다.</p> <p>가장자리는 빗밋하고 겉면에 털이 없으며 뒷면에는 잔털이 난다.</p> <p>꽃은 5~6월에 하얀색 또는 연한 자주색으로 피고 가지 끝에 1개씩 달린다.</p> <p>꽃받침조각은 6~8개이고 넓은 달걀 모양, 타원 모양 또는 긴 타원 모양이다.</p> <p>끝이 뾰족하며 꽃잎같이 보이나 꽃잎은 없다.</p> <p>열매는 수과고 달걀 모양이다. 9~10월에 익고 갈색 털이 있는 긴 암술대가 그대로 달려있다. 깃털 모양으로 변한 암술대는 전체적으로 반시계방향으로 빙글 돌아가는 모양이다.</p> <p>줄기는 가늘고 길다. 갈색이고 다른 물체를 감아 올라가는 덩굴성이다.</p> <p>국수발 굵기의 연갈색 뿌리가 여러 방향으로 내린다.</p> <p>숲 속이나 숲 가장자리의 해가 드는 곳에서 비교적 흔히 자란다. 양지 식물로 햇빛이 잘 드는 길거나 숲 가장자리 등의 물빠짐이 좋고 기름진 곳을 좋아한다. 음지에는 약하나 추위에는 강하고 바닷가나 도시의 중심지에서도 비교적 잘 자란다. 씨앗을 뿌리거나 꺾꽂이, 휘문이 등의 방법으로 번식시킨다.</p>
일반특징	