



큰줄흰나비 / *Pieris melete* Menetries, 1857

구분	설명
생물분류	곤충
속국명	흰나비속
과국명	흰나비과

과명	Pieridae
일반특징	<p>날개는 전체적으로 하얀색이고, 앞날개의 끝 부분과 무늬처럼 갈라져 있는 맥은 검은색이다. 봄형은 여름형보다 작고, 날개 윗면의 검은 무늬도 약하게 나타난다. 그러나 아랫면은 무늬처럼 갈라져 있는 맥을 따라 검은색 비늘이 발달해있다.</p> <p>암컷은 앞날개 뒷면의 검은색 무늬가 크게 발달되어 있고, 뒷날개 아랫면이 연한 노란색을 띠고 있어 수컷과 구별할 수 있다.</p> <p>숲 가장자리나 계곡 주변의 숲이 많은 곳, 사람이 사는 집 주변에 서식한다. 1년에 3~4번, 봄형은 4월 말~6월, 여름형은 6월~10월에 걸쳐 나타난다. 수컷은 축축한 땅에서 물을 먹는 것이 많이 관찰되며, 암수 모두 미나리냉이, 엉겅퀴, 꿀풀, 큰까치수영, 나무딸기 등 여러 꽃에서 꿀을 먹는다. 암컷의 경우 먹이 식물의 잎 표면, 뒷면, 줄기 등을 가리지 않고 알을 낳는다. 번데기의 모습으로 겨울을 난다.</p>