



턱받이광대버섯 / *Amanita spreta* (Peck) Sacc.

| 구분 | 설명 |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 생물분류 | 버섯 |
| 속국명 | 광대버섯속 |
| 과국명 | 광대버섯과 |
| 과명 | Amanitaceae |
| 일반특징 | <p>버섯의 자실체는 크게 갓, 주름, 대로 나누어진다. 턱받이광대버섯의 갓은 계란 모양 또는 종모양에서 둥근산 모양을 거쳐서 편평하게 되나 가운데는 오목하다. 그 조직은 흰색이다.</p> <p>주름은 백색 또는 황백색의 끝붙은 주름살이다. 그 끝은 자루의 표면에 달려 세로선을 나타내고 뺨뺨하며 가장자리는 가는 가루 모양이다.</p> <p>대는 위가 조금 가늘고 표면은 흰색이며 턱받이는 회백색의 반투명한 막이다.</p> <p>숲속의 땅에서 한곳에 몰려나거나 하나의 기관이 1개만 발생한다.</p> <p>분포지역 : 지리산</p> <p>발생계절 : 여름~가을</p> |