



풀흰나비 / *Pontia edusa* (Fabricius, 1777)

구분	설명
생물분류	곤충
속국명	풀흰나비속
과국명	흰나비과

과명	Pieridae
일반특징	<p>일반적인 흰나비류와 생김새가 매우 비슷하지만, 암수 모두 날개 아랫면에 어두운 황록색 무늬가 있기 때문에 다른 흰나비와 구별이 가능하다. 암수는 날개 윗면의 무늬가 다르다. 수컷은 검은색 줄무늬가 없으며 뒷날개 윗면이 하얀색이다. 반면 암컷은 앞날개 아랫 부분에 검은색 무늬가 하나 있고, 뒷날개 가장자리 부분에 이중으로 된 검은색 줄무늬가 있다.</p> <p>하천의 독이나 바닷가의 넓게 트여 있는 공간에 서식한다. 개체 수가 급격하게 많이 나타나더라도 같은 지역에서 연달아 발생하는 경우는 없으며, 홍수 등이 원인이 되어 먹이 식물이 사라지게 되면 그 숫자도 줄어드는 경향이 있다. 성충은 1년에 3~4번, 5월에서 10월에 걸쳐 나타난다.</p> <p>애벌레는 주로 맑은 날, 꽃이나 열매를 먹고 실 때에는 아래로 내려오는 습성이 있다. 이 나비가 많이 나타나는 지역에서는 먹이 식물의 꽃과 열매에서 알, 애벌레, 번데기를 쉽게 볼 수 있다. 번데기의 모습으로 겨울을 지낸다.</p>