



피나무잎말이나방 / *Acleris aurichalcana* (Bremer, 1864)

| 구분 | 설명 |
|------|------------|
| 생물분류 | 곤충 |
| 속국명 | 꼬마노랑잎말이나방속 |
| 과국명 | 잎말이나방과 |

| | |
|------|---|
| 과명 | Tortricidae |
| 일반특징 | <p>머리와 가슴은 노란빛이 도는 연한 갈색이다. 앞날개는 앞 가장자리가 활처럼 굽어 있으며, 날개 끝이 둥글다. 앞날개는 누런색이고 황갈색이 섞여 있다. 모든 날개맥은 분리되어 있다. 아랫입술수염은 짧고 제 3마디는 튀어나와 있다. 개체에 따라 색의 차이가 커서 연한 색을 띠는 나방은 앞날개 무늬가 선명하지 않다. 뒷날개는 갈색이고, 앞 가장자리 근처는 하얀색을 띤다.</p> <p>수컷의 생식기는 구상돌기 끝부분이 둥근 모양이다. 또한, 파악판이 시작되는 부분은 넓고 끝으로 갈수록 좁아진다. 삽입기는 크고 중간에서 구부러지며, 4~5개의 사정낭침을 갖고 있다. 암컷의 생식기는 교미구판이 짧지만 크고, 교미관은 길며, 교미주머니에는 별 모양의 시그눔이 하나 있다.</p> <p>국내는 강원도, 국외는 일본, 중국, 시베리아에 분포한다. 피나무류가 먹이 식물이며, 성충은 6월 중순~8월 중순에 나타난다.</p> |