



홍점알락나비 / *Hestina assimilis* (Linnaeus, 1758)

구분	설명
생물분류	곤충
속국명	홍점알락나비속
과국명	네발나비과

과명	Nymphalidae
일반특징	<p>암수에 따른 색깔과 무늬의 차이는 크지 않다. 오히려 계절에 따른 차이가 뚜렷하게 나타난다. 봄형은 크기가 크고 황녹색을 띠며, 여름형은 흰색을 띤다. 암컷은 날개 폭이 넓고 검은 부분이 수컷에 비해 발달하지 못했다. 애벌레는 머리에 초록색 뿔 모양 돌기가 뚜렷하게 나타나며, 겨울을 지낼 때에는 갈색으로 변한다.</p> <p>1년에 두 번 볼 수 있다. 봄형이 5월 하순~6월 중순에, 여름형은 8월 중순~9월 중순에 나타난다. 숲 가장자리나 산길 주변에 서식하며 나무 위에서 날고 있는 모습을 흔히 볼 수 있다. 먹이 식물의 줄기나 가지 또는 잎에 알을 하나씩 낳는다. 애벌레는 잎을 불규칙하게 갉아 먹으며, 단단한 잎을 먹을 때에는 잎맥을 남긴다. 낙엽 밑에서 애벌레의 모습으로 겨울을 난다.</p>