



흰갈퀴애기잎말이나방 / *Epiblema foenella* (Linnaeus, 1758)

구분	설명
생물분류	곤충
속국명	갈퀴애기잎말이나방속
과국명	잎말이나방과

과명	Tortricidae
일반특징	<p>아랫입술수염은 위로 뻗어 있고, 머리, 가슴, 배는 진한 갈색이다. 앞날개는 흑갈색이고, 뒷 가장자리 1/3 지점에서 출발하는 흰색 줄무늬는 여러 가지 모양이다. 날개 뒤쪽 끝 부분에는 타원형 무늬가 있는데, 크고 하얀색이다. 또한 그 무늬 안에는 흑갈색 점이 몇 개 있다. 뒷날개와 부드러운 털은 모두 갈색이다.</p> <p>수컷의 생식기는 파악판의 목 부분이 완만하게 들어가 있으며, 쿠쿨루스가 타원형이다. 옆돌기는 아래로 길게 처져 있다. 삽입기는 짧고 원통 모양이며, 사정낭침이 여러 개 있다. 암컷의 생식기는 산란판이 좁고 길다. 교미구는 타원형이다. 시그늄이 2개인데 하나는 뭉뚝한 소뿔처럼 생겼고, 다른 하나는 송곳처럼 생겼다.</p> <p>우리나라에서는 전국적으로 많이 발생하며, 국외는 일본, 중국, 인도, 유럽에 분포한다. 6~9월에 볼 수 있다. 애벌레는 가을부터 다음 해 봄까지 숲의 뿌리나 줄기 밑에 들어가 피해를 입힌다. 먹이 식물은 속이며, 애벌레의 형태로 겨울을 난다.</p>