



: 2026 1 16 7:06



FLORA OF KOREA
Herbarium of Chonnam National University

Lespedeza thunbergii
var. *intermedia*

Jeonranaan-do, Hwasun-gun, Buk-myeon,
Songdan-ri, Songdan -- Baek-a-san(Mt. 818m),
On Acer-Carpinus-Quercus forest flor.
국가생물자원보호를 위해 실제과표값은 하단에있습니라. 450m alt.
2010. 9. 14.
1m, H.T.

No. 105769

흰풀싸리 / *Lespedeza thunbergii* var. *intermedia* f. *alba* T.B.Lee

구분	설명
생물분류	식물
속국명	싸리속
과국명	콩과
과명	Leguminosae
일반특징	<p>요약설명 : 콩과 낙엽 활엽 관목으로 전국의 해발 100~1400m에 이르는 산기슭에서 자란다.</p> <p>분포지역 : 전국의 표고 100~1,400m에 이르는 산기슭에 자란다.</p> <p>형태 : 낙엽활엽관목</p> <p>크기 : 높이 1~2m 정도</p> <p>꽃색 : 자주색,붉은색</p> <p>개화기 : 8월,9월</p> <p>잎은 삼출겹잎이고 타원 모양 또는 긴 타원 모양이며, 둔두 또는 약간 요두이다. 굵은 맥에 이어지는 바늘 모양의 돌기가 있다. 밑부분은 좁고 뾰족하다. 양면에 갈라진 털이 있다.</p> <p>꽃은 8~9월에 하얀색으로 달리고 암술과 수술이 모두 있는 양성꽃이다.</p> <p>또한, 꽃은 잎 달린 자리에서 발달하는 총상꽃차례 또는 줄기나 가지 끝에서 나오는 원뿔모양꽃차례에 달린다. 꽃받침은 털이 있으며 깊게 4개로 갈라진다. 뒤쪽 1개가 다시 2개로 갈라지며 밑의 것이 가장 길다.</p> <p>열매는 타원 모양이고 털이 있으며 10월에 익는다. 1개의 씨앗이 들어 있는데, 씨앗은 콩팥모양이다.</p> <p>추위에는 강하지만 땅 위에 있는 부분이 피해를 받아 말라죽는다. 해가 드는 곳에서 자라는 것이 좋고, 건조에는 약하다. 기름지고 습기가 적절한 곳을 좋아한다. 대기오염에도 강하여 도시 중심에 심어도 잘 자란다. 씨앗을 뿌려 번식시킨다.</p>