



고사리 / *Pteridium aquilinum* var. *latiusculum* (Desv.) Underw. ex
A.Heller

| 구분 | 설명 |
|------|----|
| 생물분류 | 식물 |

| | |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 속국명 | 고사리속 |
| 과국명 | 고사리과 |
| 과명 | Pteridaceae |
| 일반특징 | <p>요약설명 : 고사리과 다년생의 양치식물로 일본, 오키나와, 중국, 사할린, 캄차카, 시베리아, 유럽, 남-북아메리카에 분포하며 우리나라 전국 각지에 야생한다."</p> <p>분포지역 : ▶지리적으로 일본, 오키나와, 중국, 사할린, 캄차카, 시베리아, 유럽, 남-북아메리카에 분포한다.▶전국 각지에 야생한다.</p> <p>형태 : 다년생의 양치식물</p> <p>크기 : 높이가 1m에 달한다.</p> <p>꽃색 : 백색</p> <p>개화기 : 8월,9월</p> <p>메마른 땅에서도 자라지만 척박한 땅이나 건조한 땅, 직사광선 밑 등에서는 가늘고 짧고 억세게 자라 적합하지 않다.</p> <p>뿌리줄기는 연필 크기만하고, 단단하며 가로로 뻗는다. 연두색으로 매끈하며 아래는 검은색으로 통통하다.</p> <p>앞은 딱딱한 가죽질이며 3회 날개깃모양으로 갈라져 있고 뒷면에 털이 약간 있다. 잎 끝의 가장자리가 뒤로 말려 포막처럼 된 포자낭이 달린다. 포막은 투명하게 보이며 털이 없다. 붉은갈색의 포자낭군은 잎 뒷면의 포막으로 싸여 있다.</p> |