



골등골나물 / *Eupatorium lindleyanum* DC.

구분	설명
생물분류	식물
속국명	등골나물속
과국명	국화과

과명	Compositae
일반특징	<p>요약설명 : 국화과 여러해살이풀로 일본, 오키나와, 대만, 중국, 말레이시아, 인도네시아, 태일랜드, 인도, 만주, 필리핀에 분포하며 우리나라 전국 각지에 야생한다.</p> <p>분포지역 : ▶일본, 오키나와, 대만, 중국, 말레이시아, 인도네시아, 태일랜드, 인도, 만주, 필리핀에 분포.▶전국 각지에 야생</p> <p>형태 : 여러해살이풀</p> <p>크기 : 높이 약 70cm이다.</p> <p>꽃색 : 자주색, 붉은색, 백색</p> <p>개화기 : 8월, 7월, 10월, 9월</p> <p>줄기는 전체에 거친 털이 있으며 곧게 서 있다. 뿌리는 짧은 뿌리줄기로부터 수염뿌리가 뭉쳐난다.</p> <p>잎은 마주나기하며 밑부분의 것은 꽃이 필 때 쓰러지고 중앙부의 것은 잎자루가 거의 없다. 중앙부의 잎은 둔두, 예저이다. 잎 양면에 털이 있고 뒷면에 점이 있으며 가장자리에 불규칙한 톱니가 있다.</p> <p>꽃은 7~10월에 흰색 또는 붉은자주색으로 피는데 원줄기 끝의 편평꽃차례에 달린다. 낱꽃은 5개이고 약간 자줏빛이 돈다.</p> <p>열매는 수과로 9~10월에 익으며 5각이 진 원뿔모양이고 점이 있다. 갯털은 흰색이다.</p>