



괴불애기잎말이나방 / *Apotomis geminata* (Walsingham, 1900)

구분	설명
생물분류	곤충
속국명	무늬애기잎말이나방속
과국명	잎말이나방과

과명	Tortricidae
일반특징	<p>일반특징 : 경기도 수원시, 경기도 광주시, 강원도 영월군 치악산에서 살며, 나라 밖으로는 일본에서도 발견할 수 있다. 앞날개의 가장자리의 백색 무늬가 뚜렷하다. 안쪽의 세로선은 희미하며, 앞날개의 2/3부분까지는 잔 물결 모양의 무늬가 균일하게 퍼져 있다. 뒷날개는 갈색으로 균일한 빛깔을 띤다. 개체에 따라 크기 및 색깔 차이가 크다. 생태 : 괴불나무류, 후피향나무를 기주식물로 하며, 성충은 4~10월에 출현한다. 유충은 괴불나무류나 후피향나무의 잎을 철하고 가해하는 것으로 알려져 있다. 국내 경기도 수원시, 경기도 광주시, 강원도 영월군 치악산과 국외 일본에 분포한다. 앞날개의 가장자리 및 뒷부분에는 흰색 무늬가 선명하게 나타나 있다. 안쪽 가로선은 흐릿하고, 앞날개의 2/3 부분까지 물결 무늬가 균일하게 퍼져 있다. 뒷날개는 갈색빛을 띤다. 개체에 따라 크기와 색깔이 다르다.</p> <p>괴불나무류, 후피향나무를 먹이로 하며, 4~10월에 나타난다. 애벌레는 괴불나무류나 후피향나무의 잎을 갉아먹는 것으로 알려져 있다.</p>