



기생나비 / *Leptidea amurensis* Menetries, 1859

| 구분   | 설명    |
|------|-------|
| 생물분류 | 곤충    |
| 속국명  | 기생나비속 |
| 과국명  | 흰나비과  |

|      |   |
|------|---|
| 과명   | Pieridae  |
| 일반특징 | <p>암컷은 날개가 둥글고, 수컷은 날개 윗면 끝의 검은색 무늬가 암컷보다 짙다. 이 무늬는 암수 모두 여름나비가 봄나비보다 훨씬 크고 짙다. 북방기생나비와 비슷하게 생겼으나 날개 모양이 뾰족한 것이 차이점이다.</p> <p>낮은 산지나 논밭 주변에 살고 있으며, 힘없이 나는 것처럼 보인다. 여름과 가을보다는 봄에 더 많은 편이다. 봄나비는 4월말~5월, 여름나비는 6월말~7월, 그리고 8월말~9월에 활동하므로 1년에 세 번 볼 수 있다.</p> <p>암컷은 맑은 날 먹이 식물의 줄기나 새순의 뒷면에 알을 한 개씩 낳으며, 때로는 잎 앞면 낮은 곳에서 휴식한다. 수컷의 경우는 습지에 모이고, 꿀풀, 타래난초 등의 꽃에서 꿀을 먹는다. 번데기로 겨울을 난다.</p> |