



긴꼬리제비나비 / *Papilio macilentus* Janson, 1877

구분	설명
생물분류	곤충
속국명	호랑나비속
과국명	호랑나비과

과명	Papilionidae
일반특징	<p>날개 표면이 검은색 또는 어두운 회색이며 뒷날개에는 빨간색 또는 노란색 반달 무늬가 있다. 봄나비가 여름나비보다 작고 수컷이 암컷에 비해 검은색이 짙다.</p> <p>애벌레 2~4령은 새똥 모양이지만 5령이 되면 몸의 색깔과 모양이 변하여 녹색이 되고 검은 자주색 띠가 생긴다.</p> <p>1년에 두 번, 봄형은 5월 초~6월 초, 여름형은 7~9월에 나타난다. 애벌레는 잎을 갉아 먹으며, 산지의 경사가 급하지 않은 계곡에 주로 서식한다. 운향과 식물이 있는 장소에서 흔하게 관찰된다.</p> <p>수컷은 나비 길을 형성하여 일정한 공간을 날아다닌다. 암수 모두 봄에는 수수꽃다리, 고추나무, 라일락 등의 꽃에서, 여름에는 나리, 엉겅퀴, 무궁화 등의 꽃에서 꿀을 먹지만, 수컷만 습지에서 물을 빨아 먹는다. 암컷은 오후가 되면 어두운 나무 사이를 낮게 날아 다니면서 먹이 식물의 잎 뒷면에 날개로 알을 낳는다. 가을에는 식물의 줄기에서 번데기가 되며, 그 상태로 겨울을 난다.</p>