



까락골 / *Eleocharis equisetiformis* (Meinsh.) B.Fedtsch.

구분	설명
생물분류	식물
속국명	바늘골속
과국명	사초과

과명	Cyperaceae
일반특징	<p>요약설명 : 사초과 두해살이풀로 제주, 전남, 함남북에 나며 일본, 만주, 중국에 분포한다.</p> <p>분포지역 : 제주, 전남, 함남북에 나며 일본, 만주, 중국에 분포한다.</p> <p>형태 : 두해살이풀</p> <p>크기 : 높이 30~50cm, 지름 1~2mm이다.</p> <p>꽃색 : 갈색</p> <p>개화기 : 8월,9월,7월,10월</p> <p>줄기는 약간 단단하며 굵은 몇 개의 능선이 있다. 줄기는 약간 잿빛이 도는 녹색을 띤다.</p> <p>잎은 퇴화하여 잎집이 줄기의 아랫쪽을 싸고 있다. 잎집은 약간 두꺼우며 부드럽고 유연한 반투명의 막과 같은 상태로 붉은빛을 띤다.</p> <p>꽃은 7~10월에 갈색 이삭모양으로 핀다. 이삭모양 꽃은 좁은 달걀모양으로 끝이 뾰족하고 밑부분에 있는 2개의 비늘조각이 꽃자루를 반정도 둘러싼다. 그 밖의 비늘조각은 긴 타원형으로 약간 곧추 서고 붉은갈색이 돌며 끝이 둔하다.</p> <p>열매는 수과고 넓은 거꿀달걀모양으로 누른빛이 돈다. 암술대는 밑부분이 3각뿔 모양이다.</p>