



: 2026 1 18 8:19



가시벌하늘소 / *Chlorophorus japonicus* (Chevrolat, 1863)

| 구분 | 설명 |
|------|--|
| 생물분류 | 곤충 |
| 속국명 | 범하늘소속 |
| 과국명 | 하늘소과 |
| 과명 | Cerambycidae |
| 일반특징 | <p>머리에는 중앙 세로 융기선이 없다. 앞가슴등판에는 작은 점들이 흩어져 있으며, 가장자리에 가로 홈이 있다.</p> <p>딱지날개의 길이는 너비의 2.3배이고 기부에서 가장 넓다. 날개의 시작부분에는 등판의 뒷부분과 연결되는 C자 모양의 노란색 연모 줄이 있다.</p> <p>딱지날개 끝부분에 긴 돌기가 있는데, 이는 바깥쪽으로 휘어있다. 수컷의 더듬이는 딱지날개 기부 1/3을 초과하며, 뒷다리 퇴절은 딱지날개 끝부분에 이른다. 반면 암컷의 경우는 그렇지 않다.</p> <p>번데기일 때, 앞가슴등판의 길이는 너비보다 길다. 등판 가장자리 양쪽이 평행하며 기부에는 좁은 가로 홈이 있다. 중간가슴등판은 볼록하고 뒷부분이 함몰되어 있다. 뒷가슴등판의 뒤쪽 가장자는 각이 져 있다.</p> <p>애벌레의 이마방패는 짧고 사다리꼴이며, 가장자리가 갈색이다. 윗입술의 색은 하얗고 모양은 앞으로 갈수록 좁고 둥그며, 가장자리에는 짧은 털들이 밀집되어 있다. 큰턱에는 세로 홈이 있으며 넓고 둥글다. 앞가슴등판의 앞쪽 반에는 좁은 가로 점이 2개 있다. 복부보행돌기 주변에는 갈색 털이 빽빽하게 나있다.</p> <p>알은 앞쪽은 좁고 둥그며, 반대쪽은 넓고 둥근 모양이다. 난포막은 매끈하며, 미세한 문양이 있다.</p> <p>광엽수림 또는 혼합림에 서식한다. 애벌레인 상태로 겨울을 나며, 나무 껍질 아래에 세로로 길을 판다. 다양한 꽃에 모이는 습성이 있다.</p> |