

_어린이 생물도감

: 2026 5 28 1:59



2012년도 식물·곰팡이
표본정보DB구축사업

FLORA OF KOREA
Herbarium of Chonnam National University

Gangneung-do, Jeongseon-gun, Imgae-myeon,
Jikwon-ri, Gundae -- Saengae-ryeong,
Forest margin(acer, *Carpinus*, *Prunus*, *Larix*),
국가생물자원보존을 위해 상세표본은 차단되었습니다. 700m alt.
2011. 5. 12.
In, H.T.
No. 113326

꽃벚나무 / *Prunus serrulata* var. *sontagiae* Nakai

| 구분 | 설명 |
|------|--|
| 생물분류 | 식물 |
| 속국명 | 벚나무속 |
| 과국명 | 장미과 |
| 과명 | Rosaceae |
| 일반특징 | <p>요약설명 : 장미과 낙엽활엽교목으로 중부지방의 산지에서 자란다.</p> <p>분포지역 : 중부지방의 산지에서 자란다.</p> <p>형태 : 낙엽활엽교목</p> <p>크기 : 수고 20m, 직경 90cm까지 자란다.</p> <p>꽃색 : 붉은색</p> <p>개화기 : 5월, 4월</p> <p>잎은 어긋나며 넓은 타원형이고 원저이다. 또한 점첨두보다 덜 뾰족한 상태이고 꼬리처럼 길며 톱니가 없다. 앞면에 털이 없고, 뒷면의 맥 위에 털이 있으며 가장자리에 바늘모양톱니가 있다. 잎자루에는 거친 털이 있다.</p> <p>꽃은 잎보다 먼저 피거나 같이 피며 우산모양꽃차례에 1~3개의 꽃이 달린다. 꽃자루는 윗부분에 길고 부드러운 털이 모여 있다. 꽃차례의 중심축은 없거나 밖으로 나오지 않는다. 꽃받침통은 털이 나 있거나 그렇지 않은 경우도 있다. 각각의 조각은 가장자리가 밋밋하고 털이 없다. 꽃잎은 끝부분이 깊게 파였다. 수술은 35개인데 길이가 꽃잎의 절반보다 짧으며 암술대에 털이 없다.</p> <p>열매는 둥글고 5~6월에 흑자색으로 익는다. 어린 가지에는 털이 없다.</p> <p>산지에서 자란다. 습기가 많고 평탄하며, 기름진 땅에서 잘 자란다. 생장이 빠르고 대기오염을 견디는 성질이 강하다.</p> <p>여름에 얻은 씨앗을 마른 모래와 섞어 저장해두었다가 다음 해 봄에 씨앗을 뿌려 번식시킨다.</p> <p>벚나무와 닮았지만 꽃이 잎보다 먼저 피는 것, 잎 뒷면의 맥 위와 꽃대에 털이 난 것이 차이점이다.</p> |